

Piranga rubra

Morfología:

(dimorfismo sexual)

Macho: tiene el iris café oscuro y el pico color hueso. Por encima es rojo con la cabeza, la garganta y las partes inferiores rojo rosa brillante. Las plumas de vuelo son más oscuras con bordes rojos y las plumas de la cola también rojas con los bordes internos más oscuros.

Hembra: tiene el pico amarillo pálido. Es de color amarillo pardusco con tinte oliva por encima y en las partes inferiores color amarillo. Algunas veces presenta manchas naranjas por encima y por debajo.



Alimentación:

En las áreas de reproducción: se alimenta principalmente de artrópodos (insectívoro). También se alimenta de frutos aunque en menor proporción.

En las áreas invernales: también se alimenta principalmente de artrópodos y entre los frutos que incorpora en su dieta se han registrado algunos de especies de los géneros Miconia, Ficus, Cecropia y otros de especies de la familia Loranthaceae.




Reproducción:

Esta especie se reproduce desde el suroccidente y oriente de Estados Unidos hasta el norte de México e invernala desde el centro y sur de México hasta el norte de Suramérica. El nido tiene forma de copa y es construido solamente por la hembra con vegetación herbácea seca y pastos finos. El nido es construido sobre una rama horizontal a una altura que varía de 2.5 a 15 metros. Pone de 3 a 4 huevos de color azul pálido o azul verdoso fuertemente punteado de café rojizo, los cuales incuba la hembra de 11 a 12 días.

Distribución y hábitat:

Esta ave habita desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de México. En época de invierno esta ave migra hasta países de América del Sur como Colombia, Venezuela y parte de Perú.



<https://ebird.org/species/sumtan/>

Referencias:

Avibase (2014). Species factsheet: Piranga rubra Descargado de <http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=EN&avibaseid=8FD77B9372A01106>

Arango, C. 2014. Piranga Roja (Piranga rubra). Wiki Aves Colombia.(C. Arango, Editor) . Universidad ICESI. Cali. Colombia.http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=1192

Colaptes punctigula

Morfología:

(no presenta dimorfismo sexual)

Mide aproximadamente 20 cm, tiene las partes superiores amarillas con pintas o rayas negras, su frente es negra con una coronilla y región malar rojas; partes inferiores amarillas con pintas negras; los lados de la cabeza blancos. La hembra es similar pero el rojo se restringe a la nuca y su garganta es negra.



Distribución y hábitat:

Esta especie se encuentra desde Panamá, hasta el norte de Bolivia y en el Amazonas brasileño. Se encuentra distribuida ampliamente en el territorio Colombiano hasta los 1500 msnm, exceptuando la costa pacífica al sur de Buenaventura. Habita en espacios abiertos con árboles en los estratos altos y medios de estos, también se conoce que toleran áreas fuertemente intervenidas, ya que se les puede ver dentro de ciudades, en zonas verdes.


Alimentación:

Principalmente insectívoro
su dieta se basa principalmente en hormigas y escarabajos



Comportamiento y nidación:

Estos carpinteros perforan los troncos de los árboles para hacer sus nidos, son capaces de poner 2 huevos por anidada y el macho duerme con ellos mientras que la hembra duerme en una cavidad accesoria del nido.



Referencias:

-Reyes, M. Restrepo, S. (2018). "Las aves del ecoparque del Río Pance". Recuperado de: https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/archivosAdjuntos/lasavesecoparqueriopanceano2004_0.pdf

-Delgado, M. E. 2011. Carpintero Buchipecoso (Colaptes punctigula). Wiki Aves Colombia. Universidad ICESI. Cali, Colombia. https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-editpage.php?page=Carpintero+Buchipecoso